

Daniel

Sélection d'articles des revues accessibles en ligne dans la partie professionnelle du site de la SFD

Novembre 2018



Volume 145, n° 11

Novembre 2018

Pages	Premier auteur / Institution principale	Titre résumé	Points forts
649-658	Taquin H, CHU de Nice	Les « inhibiteurs de check point » dans le traitement du mélanome	110 patients atteints d'un mélanome avancé ont été traités par une des nouvelles immunothérapies, ipilimumab, nivolumab ou pembrolizumab. Les données d'efficacité et de tolérance sont détaillées dans cet article qui montre que « la vraie vie » est un peu différente (mais pas trop) de la vie des essais cliniques. Sur l'importance de la véritable révolution que constituent ces immunothérapies anti-cancéreuses, vous lirez avec intérêt le remarquable éditorial d'Olivier Dereure, pages 645-658.
694-701	Cornille H, CHU de Caen	Un cas de lipoatrophie annulaire des chevilles	Le titre exact est « panniculite lipoatrophisante idiopathique ». L'intérêt de ce cas tient à une correction de la lipoatrophie, après la phase inflammatoire, par autogreffe de tissu adipeux. L'avantage esthétique et psychologique est évident. Cette technique n'a été utilisée qu'une seule fois antérieurement, par des chirurgiens plasticiens également normands, mais de Rouen.
706-722	Zghal M, hôpital Chrales Nicolle, Tunis	Xeroderma pigmentosum	Ce chapitre de l'EMC, publié initialement en 2014, constitue une revue générale complète sur le xeroderma pigmentosum, ses aspects génétiques, carcinologiques, cliniques et thérapeutiques. Attendons-nous à voir des progrès dans la prise en charge, actuellement difficile.

Volume 145, supplément 5

Novembre 2018

VS1 – VS41	Cribier B (Strasbourg), Amici JM (Bordeaux), Velter C (Villejuif), Basset-Seguin N (Paris)	Prise en charge des carcinomes baso-cellulaires difficiles à traiter	Ce supplément concerne les carcinomes baso-cellulaires (CBC) qu'on ne peut pas traiter facilement par une simple exérèse en un temps. Les difficultés peuvent concerner le diagnostic, le type histologique, la taille de la tumeur, sa localisation, son caractère récidivant. Les réunions de concertation pluridisciplinaire seront alors sollicitées, car plusieurs compétences sont nécessaires : oncologie, anatomo-pathologie, chirurgie cutanée dans ses dimensions carcinologique et esthétique. On lira le détail de la démarche chirurgicale (l'article est complété par deux courtes vidéos), les indications de la radiothérapie et, pour les CBC étendus inopérables ou métastatiques, les possibilités actuelles de traitement médical (inhibiteurs de la voie Hedgehog).
------------	--	--	--



Volume 79, n°5

Novembre 2018

Pages	Premier auteur / Institution principale	Titre résumé	Points forts
789-804 et	Tziotzios C, St John's Institute of Dermatology, Londres	Lichen plan et dermatoses lichénoïdes	Cette revue didactique est divisée en deux parties : d'abord une description clinique et histologique de toutes les variétés de lichen plan et de dermatoses lichénoïdes, incluant les lichens muqueux et les toxidermies lichénoïdes, et ensuite un exposé de tous les traitements envisageables, des plus classiques aux plus novateurs.
878-883	Miguel-Gomez L, étude multicentrique espagnole	Suivi à long terme de la folliculite décalvante	Etude rétrospective de 60 patients suivis au moins cinq ans. Les antibiotiques oraux et les corticoïdes locaux ont donné les meilleurs résultats. On sait qu'il n'y a pas de consensus sur ce traitement.
884-891	Okhovat JP, AAD	Bilan de 30 ans de dépistage des cancers cutanés	Mis en place en 1985, le programme de dépistage gratuit des cancers cutanés de l'AAD, appelé SPOTme, a permis d'examiner environ 2 millions de personnes et de diagnostiquer des dizaines de milliers de cancers, dont plus de 20 000 mélanomes. Les difficultés actuelles d'accès aux soins rendent encore plus nécessaires ces programmes, qui devraient être étendus à de nombreuses populations à risque et éloignées des consultations dermatologiques. La participation des médecins généralistes permettrait d'augmenter l'efficacité du dépistage.
913-920	Mangold AR, Mayo Clinic Arizona	Granulome annulaire paranéoplasique	Les Mayo Clinics ont trouvé dans leurs dossiers sept patients ayant présenté un granulome annulaire (généralisé dans six cas) pouvant répondre à la définition des dermatoses paranéoplasiques. C'est une grande rareté, et certainement pas une raison pour considérer que des bilans sont nécessaires, en dehors d'autres signes d'appel.
951-952	Cao S, Harvard Medical School	Réseaux sociaux et amélioration de la qualité des soins	Evaluations, contrôle-qualité, satisfaction-client. Tout ceci arrive en médecine, et les contenus de pages Facebook (Facebook Reviews) peuvent aider à connaître les avis des patients, et à améliorer les prestations des établissements hospitaliers, cabinets médicaux, ... Une des multiples possibilités d'exploitation des big data.



Volume 179, n°5

Novembre 2018

Pages	Premier auteur / Institution	Titre	Points forts
1033-1048	Rajabi F, Téhéran	Pathogénie de la pelade	Si vous vous intéressez à la pelade, vous admirerez cette synthèse des connaissances (et des ignorances) actuelles sur la pathogénie de cette maladie immunologique des follicules pileux, qui défie toujours les efforts thérapeutiques.
1062-1071	Svendse MT, Odense (Danemark) et laboratoires LEO	Une appli pour aider au traitement topique du psoriasis	Cette appli pour smartphone est couplée à une puce fixée sur le médicament topique utilisé, les deux étant reliées par Bluetooth. Ainsi le patient reçoit des rappels pour appliquer son traitement, et le nombre d'utilisations est enregistré. Ceci améliore la compliance et l'efficacité du traitement. Au-delà de cet essai

			clinique concluant, on peut s'attendre au développement d'applis pour aider à la compliance, par exemple dans l'acné, les adolescents étant à la fois peu compliants et friands d'applis.
1081-1087	Miola AC, Sao Paulo, Brésil	Crème à la colchicine pour les kératoses actiniques	Une crème à la colchicine 0,5% (non commercialisée en Europe) est trouvée aussi efficace que la photothérapie dynamique dans le traitement des kératoses actiniques. Cette efficacité n'est que partielle, mais le résultat est intéressant. Surtout que cette crème est peu coûteuse, argument à prendre en compte
1148-1156	Boswell K, Université de Dundee (Royaume Uni)	Avantage économique des photothérapies du psoriasis	Cet article concerne le coût des photothérapies UVB, comparé au coût des traitements topiques, dans une optique « très NHS ». L'éditorial qui l'accompagne (pages 1019-1020) élargit le débat : l'intérêt actuel pour les nouveaux traitements du psoriasis a-t-il fait perdre de vue l'intérêt des photothérapies ? C'est bien possible. Il y a de nombreux arguments, dont l'argument économique, pour les conserver dans notre arsenal.
1157-1162	Huet F, Université de Brest	La peau sensible, une neuropathie des petites fibres	Des études sensorielles quantitatives confirment l'importance de la composante neuropathique dans le « syndrome de la peau sensible ».



Volume 154, n°11

Novembre 2018

Pages	Premier auteur / Institution	Titre	Points forts
1292-1303	Torbahn G, Fondation Cochrane allemande, Freiburg	Traitement antibiotique de la borréliose précoce	Avec toute la rigueur méthodologique souhaitable (méta-analyse en réseau), les auteurs ont analysé la littérature sur le traitement des formes précoces de borréliose de Lyme. Tous les antibiotiques utilisés sont équivalents, très efficaces et bien tolérés.
1304-1311	Jull A, Ecole de soins infirmiers, Auckland	Exercice physique pour les ulcères de jambe veineux	Vous vous en doutiez, et cette analyse de la littérature le confirme : l'exercice physique, selon diverses modalités, augmente les taux de cicatrisation des ulcères veineux traités par compression. Belle démonstration, dont les deux premiers auteurs sont des infirmiers.
1320-1323	Khalil S, Université américaine de Beyrouth	Lovastatine et cholestérol topique dans le traitement des ichtyoses	Le métabolisme épidermique du cholestérol est anormal dans certaines ichtyoses. 15 patients, enfants et adultes, présentant une ichtyose autosomique récessive ont été traités par des crèmes à l'acide glycolique, et aussi par une crème associant lovastatine et cholestérol. Les résultats sont favorables.
1330-1337	Caresse Garmet A, Miami	Traitements non conventionnels du psoriasis	Vous n'y croyez peut-être pas, mais environ la moitié des patients psoriasiques ont recours aux médecines non conventionnelles (douces, alternatives, ...). Ils seront heureux d'apprendre que certaines ont subi avec succès l'épreuve des essais cliniques randomisés : topiques contenant de l'indigo ou un extrait de curcumine, curcumine orale, huile de poisson, méditation, acupuncture. C'est la littérature médicale qui le dit.