

Score de validation rétrospective PEAG

A. MORPHOLOGIE

- a. Pustules :
 - i. Typiques +2
(Douzaines de pustules <5mm de diamètre, non folliculaires)
 - ii. Compatibles +1
(pas typiques mais pas fortement évocatrices d'une autre maladie)
 - iii. Non évaluables 0
(L'aspect ne peut être jugé : stade tardif par exemple)
- b. Erythème
 - i. Typique +2
 - ii. Compatible +1
 - iii. Non évaluables 0
- c. Distribution
 - i. Typique +2
 - ii. Compatible +1
 - iii. Non évaluables 0
- d. Desquamation post-pustuleuse
 - i. Oui +1
 - ii. Non/Non évaluables 0

B. EVOLUTION

- a. Atteinte muqueuse
 - i. Oui -2
 - ii. Non 0
- b. Survenue brutale (≤ 10 jours)
 - i. Oui 0
 - ii. Non -2
- c. Guérison ≤ 15 jours
 - i. Oui 0
 - ii. Non -4
- d. Fièvre $\geq 38^{\circ}\text{C}$
 - i. Oui +1
 - ii. Non 0
- e. Polynucléaires neutrophiles $\geq 7000/\text{mm}^3$
 - i. Oui +1
 - ii. Non 0

C. HISTOLOGIE

- a. Evocatrice d'une autre pathologie -10
- b. Pas d'histologie/non représentative 0
- c. Exocytose de polynucléaires neutrophiles +1
- d. Pustules **non** spongiformes sous-cornées et/ou intraépidermiques avec œdème du derme papillaire ou pustules spongiformes sous-cornées et/ou intraépidermiques **sans** œdème papillaire. +2
- e. Pustules spongiformes sous-cornées et/ou pustules intraépidermiques **avec** œdème papillaire. +3

Interprétation

Score ≤ 0 : PEAG exclue
Score 1-4 : PEAG possible
Score 5-7 : PEAG probable
Score 8-12 : PEAG certaine