

## Stades de l'AOMI

### Le stade de l'AOMI est évalué par :

---

- L'interrogatoire : antécédent de manifestations cliniques d'ischémie survenant à l'effort ou au repos, épisodes d'ischémie aiguë, amputation
- Et l'examen clinique : palpation des pouls et mesure de l'IPS

### Stades de l'AOMI

---

- **ischémie d'effort asymptomatique**
  - IPS < 0,9 ou abolition de pouls
  - sans manifestations cliniques d'ischémie
- **ischémie d'effort symptomatique**
  - IPS < 0,9 ou abolition de pouls
  - avec manifestations cliniques ischémiques
- **ischémie permanente chronique** : association de
  - douleurs de décubitus ou de troubles trophiques depuis au moins 15 jours
  - avec une pression artérielle systolique inférieure à
    - 50 mm Hg à la cheville
    - ou à 30 mm Hg à l'orteil.

### Ischémie aiguë

---

L'**ischémie aiguë** d'un membre correspond à une altération brutale de sa perfusion microcirculatoire nutritionnelle, mettant en jeu sa vitalité immédiate. Le diagnostic est clinique et aucune exploration ne doit retarder l'intervention.

### Référence :

Artériopathie oblitérante des membres inférieurs. PND ( 2007 )