

Score de validation rétrospective de PEAG

A. MORPHOLOGIE

- | | |
|---|-----|
| a. Pustules : | |
| i. Typiques | + 2 |
| (douzaines de pustules < 5mm de diamètre, non folliculaires) | |
| ii. Compatibles | + 1 |
| (pas typiques mais pas fortement évocatrices d'une autre maladie) | |
| iii. Non évaluables | 0 |
| (l'aspect ne peut être jugé : stade tardif par exemple) | |
| b. Erythème | |
| i. Typique | + 2 |
| ii. Compatible | + 1 |
| iii. Non évaluables | 0 |
| c. Distribution | |
| i. Typique | + 2 |
| ii. Compatible | + 1 |
| iii. Non évaluables | 0 |
| d. Desquamation post-pustuleuse | |
| i. Oui | + 1 |
| ii. Non/Non évaluables | 0 |

B. EVOLUTION

- | | |
|--|-----|
| a. Atteinte muqueuse | |
| i. Oui | - 2 |
| ii. Non | 0 |
| b. Survenue brutale (≤ 10 jours) | |
| i. Oui | 0 |
| ii. Non | - 2 |
| c. Guérison ≤ 15 jours | |
| i. Oui | 0 |
| ii. Non | - 4 |
| d. Fièvre $\geq 38^{\circ}\text{C}$ | |
| i. Oui | + 1 |
| ii. Non | 0 |
| e. Polynucléaires neutrophiles $\geq 7000/\text{mm}^3$ | |
| i. Oui | + 1 |
| ii. Non | 0 |

C. HISTOLOGIE

- | | |
|--|------|
| a. Evocatrice d'une autre pathologie | - 10 |
| b. Pas d'histologie/non représentative | 0 |
| c. Exocytose de polynucléaires neutrophiles | + 1 |
| d. Pustules non spongiformes sous-cornées et/ou intraépidermiques avec œdème du derme papillaire ou pustules spongiformes sous-cornées et/ou intraépidermiques sans œdème papillaire | + 2 |
| e. Pustules spongiformes sous-cornées et/ou pustules intraépidermiques avec œdème | + 3 |

Interprétation

Score ≤ 0 : PEAG exclue
 Score 1-4 : PEAG possible
 Score 5-7 : PEAG probable
 Score 8-12 : PEAG certaine

Validé par : Dr Angèle SORIA (FISARD), novembre 2015

Référence : Sidoroff A, et al. Acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP)—a clinical reaction pattern. *J Cutan Pathol* 2001;28:113-9.