

TRAITEMENTS INTERDITS OU À UTILISER AVEC PRÉCAUTIONS

(Mise à jour : 2023)

INTERDIT – Fort inducteurs du CYP3A ou du CYP2C8 : les concentrations de dabrafenib peuvent être diminuées

Classe	Traitements
Antibiotiques	Classe des Rifamycines (e.g., rifampin, rifabutin, rifapentine),
Anticonvulsivants	Carbamazepine, oxcarbazepine phenobarbital, phénytoin, s-méphénytoin
Divers	bosentan, millepertuis

INTERDIT – Fort inhibiteurs du CYP3A, et du CYP2C8 : les concentrations de dabrafenib peuvent être augmentées

Classe	Traitements
Antibiotiques	Clarithromycin, telithromycin, troleandomycin
Antidépresseurs	Nefazodone
Antifongiques	Itraconazole, ketoconazole, posaconazole, voriconazole
Hyperlipidémisants	Gemfibrozil
Antirétroviraux	Ritonavir, saquinavir, atazanavir
Divers	Conivaptan

A UTILISER AVEC PRECAUTION : Inhibiteurs modérés du CYP3A, ou du CYP2C8 : les concentrations de dabrafenib peuvent être augmentées

Classe	Inhibiteurs modérés du CYP3A et du CYP2C8
Anti-arythmiques	Diltiazem, verapamil
Antibiotiques	Erythromycin
Antifongiques	Fluconazole
Divers	Aprepitant, cimetidine, montelukast

A UTILISER AVEC PRECAUTION : La co-administration de ces traitements avec le dabrafenib peut entraîner une perte d'efficacité.

Classe	CYP3A4, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, ou CYP2C19 susceptibles d'être affectés (induction)
Analgésiques	Alfentanil, buprenorphine, celecoxib, codeine, fentanyl, methadone, oxycodone
Anti-arythmiques	Disopyramide, dronedarone, mexiletine, propafenone, quinidine
Antibiotiques	Chloramphenicol, doxycycline, erythromycin, moxifloxacin
Anticoagulants/ Antiplaquettaires	Cilostazole, warfarin
Anticonvulsivant	Divalproex, lamotrigine, valproate, zonisamide
Antidépresseurs et Antipsychotiques	Aripiprazole, bupropion, buspirone, desipramine, haloperidol, mirtazapine, pimozone, quetiapine, trazodone, amitriptyline, clomipramine, imipramine
Antidiabétiques	Glyburide, saxagliptin, tolbutamide, nateglinide, pioglitazone, repaglinide, rosiglitazone
Antifongiques	Casposfungin, fluconazole, terbinafine
Antihistaminiques	Astemizole, chlorpheniramine, ebastine
Antihypertenseurs	Amlodipine, diltiazem, felodipine, nifedipine, nilvadipine, nisoldipine, verapamil
Antimigraigneux	Diergotamine, eletriptan, ergotamine
Corticostéroïdes	Dexamethasone, méthylprednisolone, oral budesonide
Dysfonction Erectile	Sildenafil, tadalafil, vardenafil
Inhibiteurs HMG-CoA Réductase	Atorvastatin, lovastatin, simvastatin, cerivastatin, rosuvastatin, pravastatin
Hypnotiques et Sédatifs	Alprazolam, brotizolam, diazepam, estazolam, midazolam, triazolam, zolpidem, zopiclone
Immunosuppresseurs	Everolimus, sirolimus, tacrolimus
Divers	Aprepitant, cisapride, darifenacin, disopyramide, leflunomide, methohexital, oral contraceptives, quinine, ranitidine, solifenacin, sulfasalazine, tramadol, tolvaptan, chloroquine, zopiclone
Antagoniste de l'aldostérone	Eplerenone
Agents altérant le pH	Dexlansoprazole, esomeprazole, famotidine, ilaprazole, lansoprazole, omeprazole, pantoprazole, rabeprazole, ranitidine