

PHOTOTHERAPIE PREVENTIVE DE LA LUCITE ESTIVALE BENIGNE

- Indiquée dans les lucites sévères résistantes aux traitements médicamenteux
- 15 à 20 séances (2 ou 3 fois/sem) pendant 6 à 8 semaines avant l'exposition estivale

Protocole de photothérapie UVB-TL01 dans la LEB

Séance Phototype	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	Dose cumulée (J/cm ²)
II	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80	0.90	1	7.25
III	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80	0.90	1	1.10	1.20	9.30
IV	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80	0.90	1	1.10	1.20	1.30	1.40	11.55
V	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80	0.90	1	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	14.00

Protocole de PUVAthérapie 8-MOP (0.5mg/kg) dans la lucite estivale bénigne

Phototype	Dose initiale J/cm ²	Progression	Dose maximale J/cm ²	Dose cumulée sur 15 séances J/cm ²
II	0.5	0.25 J/cm² à chaque séance	4	33.75
III	1		4.5	41.25
IV	1.5		5	48.75
V	2.5		6	63.75

En cas de déclenchement de la lucite

- Application d'un dermocorticoïde
- Réduire la progression des doses