

Source :

M. Beylot-Barry, O. Dereure, B. Vergier, S. Barete, L. Laroche, L. Machet, M.-H. Delfau-Larue, M. D'Incan, F. Grange, N. Ortonne, J.-P. Merlio, M. Bagot, pour le Groupe français d'étude des lymphomes cutanés (GFELC). *Prise en charge des lymphomes T cutanés : recommandations du Groupe français d'étude des lymphomes cutanés. Ann Dermatol Venereol 2010;137;611-21*

Classification EORTC / ISCL 2007 des lymphomes T cutanés de type MF/SS

Stadification EORTC / ISCL 2007 des lymphomes T cutanés non MF/SS

Tableau 2 Classification EORTC/ISCL 2007 des lymphomes T cutanés de type MF/SS [10].

T : atteinte cutanée

- T1 : lésions cutanées limitées érythémateuses non infiltrées, papules ou plaques < 10 % SC :
 - T1a : lésions érythémateuses non infiltrées (*patches*)
 - T1b : plaques
- T2 : lésions cutanées érythémateuses non infiltrées, papules ou plaques > 10 % SC :
 - T2a : lésions érythémateuses non infiltrées (*patches*)
 - T2b : plaques
- T3 : une ou plusieurs tumeurs (une tumeur est définie par une taille > à 1 cm)
- T4 : érythrodermie (surface corporelle atteinte > 80 %).

N : statut ganglionnaire

- N0 : pas d'adénopathie périphérique palpable
- N1 : adénopathie périphérique palpable, histologie grade 1 allemand ou NCI LN0-2 :
 - N1a : pas de clone
 - N1b : clone +
- N2 : adénopathie périphérique palpable, histologie grade 2 allemand ou NCI LN3 :
 - N2a : pas de clone
 - N2b : clone +
- N3 : adénopathie périphérique palpable, histologie grade 3–4 allemand ou NCI LN4, clone +/-
- Nx : adénopathie périphérique palpable, pas d'histologie de confirmation

M : statut viscéral

- M0 : pas d'atteinte viscérale
- M1 : atteinte viscérale (à documenter histologiquement)

B : atteinte sanguine

- B0 : < 5 % de cellules de Sézary circulantes :
 - B0a : pas de clone
 - B0b : clone +
- B1 : > 5 % de cellules de Sézary circulantes < 1000/μL
 - B1a : pas de clone
 - B1b : clone +
- B2 : cellules de Sézary > 1000/μL avec un clone T majoritaire

Soit la stadification	T	N	M	B
IA (plaques infiltrées ou non < 10 % surface corporelle)	1	0	0	0
IB (plaques infiltrées ou non > 10 % surface corporelle)	2	0	0	0
IIA (plaques infiltrées ou non avec adénopathie périphérique palpable, histologiquement non spécifique)	1,2	1,2	0	0
IIB (tumeurs)	3	0 à 2	0	0
IIIA (érythrodermie sans envahissement sanguin)	4	0 à 2	0	0
IIIB (érythrodermie avec envahissement sanguin limité)	4	0 à 2	0	1
IVA1 (envahissement sanguin important sans adénopathie spécifique)	1 à 4	0 à 2	0	2
IVA2 (adénopathie spécifique)	1 à 4	3	0	0 à 2
IVB (atteinte viscérale)	1 à 4	0 à 3	1	0 à 2

SC : surface corporelle ; EORTC : European Organization for Research and Treatment of Cancer ; ISCL : *International society for cutaneous lymphoma* ; MF : syndrome de Sézary ; SS : syndrome de Sézary.

Tableau 3 Stadification EORTC/ISCL des lymphomes cutanés non MF/SS [43].

T : atteinte cutanée

T1 : lésion cutanée solitaire :

T1a : lésion < 5 cm

T1b : lésion > 5 cm

T2 : atteinte cutanée régionale : multiples lésions limitées à 1 ou 2 régions contiguës du corps :

T2a : surface cutanée atteinte < 15 cm

T2b : > 15 cm et < 30 cm

T2c : > 30 cm

T3 : atteinte cutanée généralisée

T3a : multiples lésions cutanées touchant deux régions cutanées non contiguës

T3b : multiples lésions touchant plus de trois régions du corps

N : atteinte ganglionnaire :

N0 : absence d'adnéopathie clinique ou d'envahissement histologique ganglionnaire

N1 : atteinte ganglionnaire périphérique dans l'aire ganglionnaire (1 adnéopathie) de drainage de l'atteinte cutanée

N2 : atteinte d'au moins 2 adnéopathies ou d'au moins une adnéopathie en dehors d'une aire ganglionnaire de drainage

N3 : atteinte d'une adnéopathie profonde

M0 : absence d'atteinte viscérale

M1 : atteinte viscérale : doit être documentée histologiquement

Par définition un lymphome cutané primitif non épidermotrope est N0, M0 au diagnostic.

EORTC : European Organization for Research and Treatment of Cancer ; ISCL : *International society for cutaneous lymphoma* ; MF : syndrome de Sézary ; SS : syndrome de Sézary.