

7^{ème} édition de la classification AJCC

MELANOME

CLASSIFICATION TNM

Tumeur primitive

Classification T	Epaisseur Breslow en mm	Ulcération/mitose
T1	≤ 1 mm	a : sans ulcération et mitoses < 1/mm ² b : avec ulcération et/ou mitoses > 1/mm ²
T2	1,01 – 2 mm	a : sans ulcération b : avec ulcération
T3	2,01 – 4 mm	a : sans ulcération b : avec ulcération
T4	≥ 4,01 mm	a : sans ulcération b : avec ulcération

Ganglions lymphatiques régionaux

Classification N	Nombre de ganglions métastatiques	Masse métastatique ganglionnaire
N1	1 ganglion	a : micrométastase b : macrométastase
N2	2 à 3 ganglions	a : micrométastase b : macrométastase c : métastase(s) en transit satellite(s) sans ganglion métastatique
N3	> 4 ganglions Ou conglomérat d'adénopathies Ou métastase(s) en transit / satellite(s) avec ganglion métastatique	

Métastases à distance

Classification M	Site métastatique	Taux de LDH sérique
M1a	Métastase(s) cutanée(s), ganglionnaire(s) à distance	Normal
M1b	Métastase(s) pulmonaire(s)	Normal
M1c	Toutes autres métastases viscérales	Normal
	Toute localisation métastatique	Elevé

STADES DE LA MALADIE AJCC 7^{EME} EDITION

Stades AJCC	T	N	M
0	In situ	N0	M0
1A	T1a		
1B	T1b T2a		
IIA	T2b T3a		
IIB	T3b T4a		
IIC	T4b		
IIIA	Tout T mais non ulcéré (T1 – 4a)		
IIIB	Tout T ulcéré (T1 – 4b)	Micrométastases (N1a ou N2a)	
	Tout T mais non ulcéré (T1 – 4 a)	N1b ou N2b ou N2c	
IIIC	Tout T ulcéré (T1 – 4b)	N1b ou N2b ou N2c	
	Tout T	N3	
IV	Tout T	Tout N	M1

Référence : Actualisation des recommandations de la prise en charge du mélanome stade I à III. SFD 2016.

