

Score EuroSCAR pour la validation du diagnostic de PEAG

Ref : Sidoroff et al. J Cutan Pathol 2001; 28: 113–119

Morphologie (aspect clinique)	Pustules	Typiques	+2
		Compatibles	+1
		Non conclusives	0
	Erythème	Typique	+2
		Compatible	+1
		Non conclusif	0
	Distribution	Typique	+2
		Compatible	+1
		Non conclusive	0
	Desquamation post-pustuleuse	Présente	+1
Absente/non conclusive		0	
Evolution et biologie	Atteinte muqueuse	Présente	-2
		Absente	0
	Début aigu depuis moins de 10 jours	Oui	0
		Non	-2
	Guérison en moins de 15 jours	Oui	0
		Non	-4
	Fièvre $\geq 38^{\circ}\text{C}$	Oui	+1
		Non	0
	PNN $\geq 7000/\text{mm}^3$	Oui	+1
		Non	0
Histologie	Autre diagnostic		-10
	Non représentative ou histologie non faite		0
	Exocytose de PNN		+1
	Pustules sous-cornées ou intra-épidermiques non spongiformes avec œdème papillaire ou pustules spongiformes sans œdème papillaire		+2
	Pustules sous-cornées ou intra-épidermiques spongiformes avec œdème papillaire		+3

PNN : polynucléaires neutrophiles

0 : pas de PEAG ; 1 à 4 : PEAG possible ; 5 à 7 : PEAG probable ; 8 à 12 : PEAG certaine